



**n é b i h**  
Termőföldtől az asztalig

**Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**  
Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi  
Igazgatóság



1118 Budapest, Budaörsi út 141-145.  
Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960  
E-mail: [nti@nebih.gov.hu](mailto:nti@nebih.gov.hu)  
[www.nebih.gov.hu](http://www.nebih.gov.hu)

**Ügyintéző:** dr. Szabóné K. Gabriella, dr. Kelemen Mária  
**Határozatszám:** 04.2/2265-1/2014  
**Oldalak száma:** 6 oldal  
**Melléklet:** -

**TÁRGY:** **Folicur Solo gombaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása

A **Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal**, mint elsőfokú élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (a továbbiakban: engedélyező hatóság) a **Bayer Hungária Kft** (1123 Budapest, Alkotás u. 50.) által képviselt **Bayer Crop Science AG** (Alfred-Nobel-Str. 50, D-40789 Monheim am Rhein, Németország) ügyfél részére a **Folicur Solo gombaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének módosítása tárgyában, hivatalból indult eljárásban meghozta az alábbi

### HATÁROZATOT:

Az engedélyező hatóság az **Folicur Solo gombaölő permetezőszer** forgalomba hozatali és felhasználási engedélyének a megadásáról rendelkező **FVM 21042/1996** számú határozatot - egyéb rendelkezések változatlanul hagyása mellett – az alábbiak szerint módosítja:

#### I. Az engedélyokirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

##### 4. A növényvédő szer felhasználására vonatkozó előírások:

Kultúra	Károsító	Kezelések maximális száma	Két kezelés között eltelt minimális időtartam (nap)	Dózis maximum (l/ha)	Permetlé (l/ha)	ml szer / 10 l víz (kertészeti kultúrák esetében)	A kezelés utolsó időpontja (fenológijához viszonyítva)
búza (őszi), rozs, tritikálé	gabonalisztharmat, rozsdá-, helmintospóriumos-, szeptóriás betegségek, kalászfuzáriózis	2	14	1,0	300-400		szemképződés kezdete – BBCH 71
árpa	gabonalisztharmat, rozsdá-, helmintospóriumos-, szeptóriás betegségek, kalászfuzáriózis	2	14	1,0	300-400		virágzás kezdete – BBCH 61
zab	gabonalisztharmat, rozsdá-, helmintospóriumos-, szeptóriás betegségek, kalászfuzáriózis	2	14	1,0	300-400		virágzás vége – BBCH 69

<b>káposztarepce</b>	plenodómuszos-, szklerotíniás-, botrítisztes és alternáriás betegségek, fagykár csökkentés	2	14	0,5-1,0	300-500		50%-os virágzás a fővirágzaton – BBCH 65
<b>meggy, cseresznye</b>	monília, blumeriellás levélfoltosság	2	14	0,75-1,0	800-1000	8-10	virágzás vége – BBCH 69
<b>kajszi, őszibarack, szilva</b>	monília, gnomóniás levélfoltosság, tafrinás levélfodrosodás	3	14	0,75-1,0  1,0	800-1000	8-10  10	fajtára jellemző színeződés kialakult – BBCH 85
<b>alma</b>	lisztharmat, varasodás	4	14	0,5*	800-1000	5	4 héttel betakarítás előtti állapot – Érés kezdeté – BBCH81
<b>szőlő</b>	lisztharmat, szürkepenészes rothadás	3	12	0,4	800-1000	4	érés kezdeté – BBCH 81
<b>zeller, petrezselyem- gyökér, pasztinák, torma</b>	alternáriás-, szeptóriás-, cerkospóras levélfoltosság, lisztharmat	3	14	0,75-1,0	400-600	8-10,0	80%-os gyökérvastagság BBCH 48
<b>zeller (szár)</b>	szeptóriás levélfoltosság, lisztharmat	2	14	0,75-1,0	400-600	8-10,0	80%-os gyökérvastagság BBCH 48
<b>petrezselyem (levél)</b>	szeptóriás levélfoltosság, lisztharmat	1	-	0,75-1,0	400-600	8-10,0	betakarítás előtt 14 nappal
<b>spárga</b>	rozsdá	2	10	1,0-1,5	500-1000	10,0-15,0	nincs korlátozás (kezelés első időpontja: spárgasípok betakarítása után)
<b>fokhagyma</b>	rozsdá, alternáriás levélfoltosság, botrítisztes betegség	2	7	0,75-1,0	250-500	8-10,0	21 nappal betakarítás előtt dőlés kezdeté BBCH 47
<b>metélőhagyma, póréhagyma</b>	rozsdá, alternáriás levélfoltosság, botrítisztes betegség	1	-	0,75-1,0	250-500	8-10,0	14 nappal betakarítás előtt
<b>kerti kömény, ánizs</b>	lisztharmat	1	-	0,5-1,0	250-500	5,0-10,0	60 nappal betakarítás előtt
<b>díszfák, díszcserjék</b>	apiognomóniás-, gnomóniás-, levélfoltosság, lisztharmat	2	10	0,75-1,0	800-1500	8-10	nincs korlátozás

\*: kontakt készítménnyel kombinálva

**Előírt növényvédelmi technológia:**

**Kalászosokban (búza, árpa, rozs, zab, tritikále)** a gombaölő szert gabonalisztharmat ellen a betegség első tüneteinek megjelenésekor kell alkalmazni. Szárbaindulás után a védekezés általában több betegség ellen irányul, ezért a kezelést megelőző jelleggel célszerű elvégezni, azaz szárbaindulás kezdetén, kalászhányás végén, virágzás kezdetén végzett egy-egy permetezéssel.

**Káposztarepcében** a készítmény őszi kezelés esetén alkalmas a káposztarepce kifagyásának csökkentésére, a szárbaindulás késleltetésére, a gyökérnyak vastagság, illetve a gyökér/lomb arány növelésére. A készítményt ősszel, a repce 4-8 leveles állapotában kell kijuttatni, lehetőleg 12 °C feletti hőmérsékleten. Fagykárcsökkentés céljára a javasolt dózis 0,5 l/ha. A tavaszra áthúzódó gombaölő hatás fokozása érdekében a dózis 0,75-1,0 l/ha-ra növelhető.

Tavasszal gombabetegségek ellen a repce szárbaindulásától a virágzás kezdetéig alkalmazandó, 0,75-1,0 l/ha dózisban egyszer, vagy kétszer kijuttatva. (Őszi kezelés esetén legfeljebb egy tavaszi kijuttatás végezhető). A tavaszi kezelés a repce növekedésére is hat: csökkenti a növénymagasságot és a megdőlést, növeli a szárszilárdságot, serkenti az oldalhajtások képződését.

**Csonthéjasokban** monília hajtás- és virágfertőzés ellen erős fertőzési nyomás esetén a kezeléseket megelőző módon, virágzás előtt (fehérbimbós stádium végén) és virágzás végén, szíromhullás kezdetén szükséges elvégezni. Kevésbé járványveszélyes körülmények között, szárazabb, melegebb időjárás esetén egy védekezés is elegendő a virágzás kezdeti szakaszában.

**Cseresznyében, meggyben** a blumeriellás levélbetegség ellen a kezeléseket a kezdeti enyhe levéltünetek megjelenésekor célszerű megkezdeni, és a fertőzés alakulása szerint megismételni.

**Őszibarackban** tafrinás levélfodrosodás ellen a permetezéseket a kora tavaszi időszakban elvégzett rezes, kénes lemosó permetezéseket követően pirosbimbós fenológiai stádiumban indítjuk, és 14 naponként 1-2 alkalommal folytatjuk. Amennyiben 14 napnál rövidebb permetezési forduló indokolt – például hűvös tavaszi időjárás esetén – a permetezést más hatóanyagot tartalmazó gombaölő szerrel kell elvégezni. Az előírt permetlé-mennyiség be nem tartása a biológiai hatékonyságot jelentősen csökkentheti.

**Kajsziabarackban** gnomóniás levélbetegség ellen a védekezéseket előrejelzésre alapozva, az aszkospóra szóródás intenzív szakaszában kezdjük el, virágzást követően 14 naponkénti gyakorisággal folytassuk.

**Almában** almafalisztharmat ellen a védekezéseket megelőző jelleggel kezdjük el, és a fertőzési nyomás alakulása szerint a virágzást követően 14 naponként, július végéig folytassuk. A kórokozóra kevésbé fogékony fajtáknál (Delicious) a védekezések számát csökkenteni lehet. Almafavarasodás ellen a kezeléseket előrejelzésre alapozva, preventív módon kezdjük el, és a fertőzés erőssége szerint blokk-szerűen folytassuk július végéig. A készítményt járványhelyzettől függetlenül kontakt hatóanyagú készítményekkel kombináljuk.

**Szőlőben** a gombaölő szert önmagában csak lisztharmat ellen, prevenciók céljával javasolt felhasználni. Amennyiben a vegetációs időszakban egyidejűleg a szürkepenészes rothadás ellen is szükséges a fürtvédelem, akkor virágzáskor, fürtzáródáskor, zsendüléskor gyenge fertőzési nyomásnál önmagában is elegendő felhasználni, erős fertőzésnél speciális botriticid készítménnyel javasolt kombinálni. A kijuttatásnál az előírt permetlé-mennyiséget az ültetvény művelésmódjához, a lombzat nagyságához, az alkalmazott géptípustól függően célszerű megválasztani.

**Petrezselyemben, pasztinákban, zellerben és tormában** a permetezéseket megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell elkezdeni. A permetezéseket a fertőzési nyomástól függően 14 naponta meg lehet ismételni.

**Spárgában** a betegség kialakulásának kezdetén, de leghamarabb a spárgasípok betakarítása után lehet a védekezést megkezdeni. A gombaölő szert más hatásmechanizmusú készítményekkel váltogatva kell felhasználni.

**Fokhagymában, metélőhagymában és póréhagymában** a permetezéseket a gombás betegségek ellen megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell elvégezni.

**Kerti köményben és ánizsban** lisztharmat ellen a gombaölő szert megelőző jelleggel, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell felhasználni.

**Díszfák és díszcserjék** gombás betegségei ellen a készítmény 0,75-1,0 l/ha-os dózisban használható fel. A permetezéseket preventíven, de legkésőbb az első tünetek megjelenésekor kell elvégezni. Szükség esetén a kezelést 10-14 nap múlva meg lehet ismételni.

A permetlé mennyiségét a művelésmódtól, a védendő növényfelület nagyságától, és az alkalmazott növényvédelmi berendezés típusától függően kell megválasztani.

**Légi kijuttatás:** kalászosokban 50-80 l/ha, repcében 50 l/ha víz felhasználásával.

**II. Az engedélyokirat 5. pontjának várakozási időkre vonatkozó rendelkezései helyébe az alábbi szöveg kerül:**

### **5.3. Várakozási idők:**

**5.3.1. Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap**

**5.3.2. Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:**

kalászos gabonafélék (őszi búza, őszi és tavaszi árpa, rozs, zab, tritikálé)	30 nap
káposztarepce	35 nap
csontthéjasok (meggy, cseresznye, kajszi, őszibarack, szilva)	14 nap
alma	28 nap
szőlő	35 nap
petrezselyemgyökér, pasztinák, torma, gumós zeller	21 nap
fokhagyma	21 nap
metélőhagyma, levélpetrezselyem	14 nap
póréhagyma	14 nap
szárzeller	21 nap
ánizs, kerti kömény	60 nap
spárga	előírászerű felhasználás esetén nem szükséges
díszfák, díszcserjék	előírászerű felhasználás esetén nem szükséges

**III. Az engedélyokirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul:**

### **9. Eltarthatóság:**

Fizikai-kémiai tulajdonságait szokásos tárolási feltételek mellett legalább két évig megőrzi.

Tájékoztató adat: A gyártó által vállalt eltarthatósági idő **3 év**.

#### IV. Az engedélyokirat 10. pontjába foglalt szövegrész helyébe az alábbi szöveg kerül:

##### *10. A növényvédő szer kiszerezése, csomagolása:*

*a kiszerezés térfogata: 50 ml, 250 ml, 1 liter, 5 liter*

*a csomagolóanyag anyaga: HDPE vagy COEX/EVOH*

Az engedélyokirat egyéb előírásai változatlanok.

Az ügyfél a 2014. szeptember 30. után gyártott tételeket a jelen határozatnak megfelelő címkével köteles forgalomba hozni. Ezzel egyidejűleg a megváltozott termék címkét be kell nyújtani elektronikus úton az engedélyező hatósághoz nyilvántartás céljából.

Jelen határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.

A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól a határozatot hozó Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal elleni kereset indításával.

A keresetlevelet a felülvizsgálni kért határozat közzétételétől számított harminc napon belül az engedélyező hatóságnál, 3 példányban kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként kell postára adni.

### INDOKOLÁS

Az engedélyező hatóság a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117 EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 1107/2009/EK rendelet (a továbbiakban: *EK Rendelet*) 51. cikkének értelmében, szakmai szervezetek és hivatásos felhasználók bevonásával áttekintette az engedélyezett növényvédő szerek engedélyeit kisebb jelentőségű felhasználásokra (kiskultúrákra) történő kiterjesztés céljából.

Az engedélyező hatóság a **Folicur Solo gombaölő permetezőszer** esetében megállapította, hogy az engedély kiskultúrákra történő kiterjesztésének *EK Rendeletben* meghatározott feltételei fennállnak, ezért az *EK Rendelet 51. cikke*, valamint a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004. (V.15.) FVM rendelet (a továbbiakban: *R.*) eljárásra vonatkozó részletszabályai alapján a **Folicur Solo gombaölő permetezőszer** engedélyét hivatalból módosította, az engedélyt petrezselyem, pasztinák, torma, zeller, spárga, fokhagyma, metélőhagyma, póréhagyma, kertí kömény és ánizs kultúrára valamint díszfákra, díszcserjékre kiterjesztette.

A címkézésre vonatkozó rendelkezés az *EK rendelet 65. cikkén*, valamint az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a növényvédő szerek címkézésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló 547/2011/EU rendeleten alapul.

A csomagolási hulladékok kezelésére, ártalmatlanítására, a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről szóló 103/2003. (IX.11.) FVM rendelet előírásait szükséges alkalmazni.

Az engedélyező hatóság határozatát a *Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról* szóló 22/2012 (II. 29.) *Korm. rendelet* 3. § (1) bekezdésében, 5. § (1) bekezdés c) pontjában, 8. § (1) bekezdésében és 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi *CXL. törvény* (a továbbiakban: *Ket.*) 71.§ (1) bekezdésének és a 72. §-ának megfelelően hozta meg.

A fellebbezés lehetősége a *Ket.* 100. § (1) bekezdésének e) pontja alapján került kizárásra, a bírósági felülvizsgálat lehetőségéről szóló tájékoztatás a *Ket.* 100. § (2) és 109. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2014. április 23.

Dr. Oravecz Márton  
elnök  
nevében és megbízásából:

  
  
Jordán László  
igazgató

P.H.

**Kapja:**

1. Ügyfél hazai képviselője
2. Irattár

(108/2014)